



PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

DEPARTAMENTO DE SALUD DEL CONDADO DE MONO

www.monohealth.com/Coronavirus

REFUERZOS DE LA VACUNA PFIZER CONTRA COVID-19 APROBADOS PARA EL GRUPO DE 5 A 11 AÑOS DE EDAD

Se alienta a vacunar a los niños sin problemas de inmunidad con el primer refuerzo cuando hayan pasado por lo menos cinco meses de la segunda dosis

2 de junio 2022. El 24 de mayo de 2022, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) anunció que seguiría la recomendación a favor de las dosis de refuerzo de Pfizer contra COVID-19 de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) para los niños de 5 a 11 años de edad. Se recomienda dar el refuerzo a los niños sin problemas de inmunidad cuando hayan pasado por lo menos cinco meses de la segunda dosis de Pfizer.

¿Quiénes son elegibles para los refuerzos de la vacuna?

5 a 11 años:

- Las personas sin problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir una primera dosis de refuerzo de Pfizer cuando hayan transcurrido por lo menos cinco meses de la segunda dosis de Pfizer.
 - Al momento, no se recomienda un segundo refuerzo.
- Las personas con problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir una dosis adicional de Pfizer si transcurrieron por lo menos cuatro semanas de la segunda dosis de Pfizer.
 - deberían recibir una primera dosis de refuerzo de Pfizer cuando hayan transcurrido por lo menos tres meses de la (tercera) dosis adicional de Pfizer.
 - Al momento, no se recomienda un segundo refuerzo.

12 a 17 años:

- Las personas sin problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir una primera dosis de refuerzo de Pfizer cuando hayan transcurrido por lo menos cinco meses de la segunda dosis de Pfizer.
 - Al momento, no se recomienda un segundo refuerzo.
- Las personas con problemas de inmunidad de este grupo de edad:

- deberían recibir una dosis adicional de Pfizer si transcurrieron por lo menos cuatro semanas de la segunda dosis de Pfizer.
- deberían recibir una primera dosis de refuerzo de Pfizer cuando hayan transcurrido por lo menos tres meses de la (tercera) dosis adicional de Pfizer.
- deberían recibir una segunda dosis de refuerzo de Pfizer cuando hayan transcurrido por lo menos cuatro meses del primer refuerzo.

18 a 49 años

- Las personas sin problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir un primer refuerzo de su elección si pasó el tiempo mínimo desde haber completado la serie principal de vacunas:
 - Pfizer o Moderna: haber recibido la segunda dosis por lo menos cinco meses antes.
 - Johnson & Johnson: haber recibido la segunda dosis por lo menos dos meses antes.
 - Por el momento, no hay recomendación de un segundo refuerzo si se recibió una vacuna de mRNA (Pfizer o Moderna) como serie principal.
 - Podrán recibir un segundo refuerzo de Pfizer o Moderna si recibieron dos dosis de Johnson & Johnson y pasaron por lo menos cuatro meses desde la segunda dosis.
- Las personas con problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir una dosis adicional de Pfizer o Moderna si transcurrieron por lo menos cuatro semanas de la segunda dosis de Pfizer o Moderna.
 - deberían recibir una dosis adicional de Pfizer o Moderna si transcurrieron por lo menos cuatro semanas de la dosis de Pfizer o Moderna.
 - deberían recibir un primer refuerzo de su elección si pasó el tiempo mínimo desde haber completado la serie principal de vacunas:
 - Pfizer o Moderna: haber recibido la (tercera) dosis adicional por lo menos tres meses antes.
 - Johnson & Johnson: haber recibido la segunda dosis por lo menos dos meses antes.
 - deberían recibir una segunda dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna cuando hayan transcurrido por lo menos cuatro meses del primer refuerzo.

Más de 50 años

- Las personas sin problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir un primer refuerzo de su elección por lo menos dos meses después de haber recibido la dosis de Johnson & Johnson o cuando hayan transcurrido por lo menos cinco meses de haber recibido la serie principal de Pfizer o Moderna.

- deberían recibir una segunda dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna cuando hayan transcurrido por lo menos cuatro meses del primer refuerzo.
- Las personas con problemas de inmunidad de este grupo de edad:
 - deberían recibir una dosis adicional de Pfizer o Moderna si transcurrieron por lo menos cuatro semanas de la segunda dosis de Pfizer o Moderna.
 - deberían recibir una dosis adicional de Pfizer o Moderna si transcurrieron por lo menos cuatro semanas de la dosis de Pfizer o Moderna.
 - deberían recibir un primer refuerzo de su elección si pasó el tiempo mínimo desde haber completado la serie principal de vacunas:
 - Pfizer o Moderna: haber recibido la (tercera) dosis adicional por lo menos tres meses antes.
 - Johnson & Johnson: haber recibido la (segunda) dosis adicional por lo menos dos meses antes.
 - deberían recibir una segunda dosis de refuerzo de Pfizer o Moderna cuando hayan transcurrido cuatro meses del primer refuerzo.

CLÍNICAS DE VACUNACIÓN DE COVID-19

Visite myturn.ca.gov para coordinar una cita de vacunación contra COVID-19, o pase por la clínica de exámenes de COVID-19 de Salud Pública del condado de Mono para darse la vacuna.

PRUEBAS DE COVID-19

Tanto OptumServe como Salud Pública del condado de Mono cuentan con clínicas que hacen pruebas de COVID-19 gratuitas en el condado (dependiendo de cuestiones meteorológicas). Asimismo, todos los hogares estadounidenses tienen derecho a adquirir tres (3) pruebas de COVID-19 gratuitas para realizarse en casa ofrecidas por el gobierno federal. Las pruebas son completamente gratis, y los pedidos se enviarán en 7 a 12 días. Se puede acceder a las pruebas aquí: <https://www.covid.gov/tests>.

Sobre las pruebas:

- Las pruebas para realizarse en casa son pruebas rápidas de antígeno, no PCR.
- Se pueden hacer en cualquier lado.
- Resultados en 30 minutos (no hay que ir al laboratorio).
- Las pruebas son fiables independientemente de que se tengan síntomas de COVID-19 o no.
- Las pruebas son fiables independientemente de que se tengan todas las vacunas contra la COVID-19.

Cuándo es necesario hacerse la prueba:

- Si comienza con síntomas de COVID-19, como fiebre, dolor de garganta, secreción nasal o pérdida del gusto o del olfato, o
- Al menos 5 días después de haber estado en contacto estrecho con alguien enfermo de COVID-19, o
- Cuando vaya a reunirse con un grupo de personas, particularmente si son personas que tienen riesgo de enfermarse de gravedad o que no tengan la pauta de vacunación completa.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Mono ofrece pruebas de detección de COVID-19 en otros lugares del Condado en distintos momentos durante la semana. Si bien tanto OptumServe como el Departamento de Salud Pública del Condado de Mono aceptan visitas sin cita previa en sus clínicas de prueba de detección de COVID-19, se recomienda encarecidamente la inscripción previa ya que aquellas personas que no tengan cita previa serán aceptadas en función de la disponibilidad de recursos.

Se puede acceder al calendario de pruebas de COVID-19 aquí:

<https://coronavirus.monocounty.ca.gov/pages/health>.

###